

## NAJAVAŽNIJI ŠIROKOLISNI KOROVI



Abutilon - *Abutilon t.*



Ambrožija - *Ambrosia a.*



Čičak - *Xanthium s.*



Dvornik - *Polygonum spp.*



Iva - *Iva x.*



Mišljankinja - *Stellaria m.*



Njiv. lubeničarka - *Hibiscus t.*



Palamida - *Cirsium a.*



Pepeljuga - *Chenopodium a.*



Poljska gorušica - *Sinapis a.*



Pomoćnica - *Solanum n.*



Poponac - *Convolvulus a.*



Prst.čestoslavica - *Veronica h.*



Šir - *Amaranthus r.*



Tatula - *Datura s.*



Vilina kosica - *Cuscuta spp.*

## NAJAVAŽNIJI USKOLISNI KOROVI



Muhar - *Setaria spp.*



Sirak - *Sorghum h.*

Za sva pitanja pozovite Vašeg  
savetodavca iz Agroservisa Sunoko:

mob: \_\_\_\_\_

SUNOKO d.o.o. Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, 21000 Novi Sad, Srbija  
Tel.: +381(0)21 4878 111, Fax.: +381(0)21 5 222 77  
info@sunoko.rs, www.sunoko.rs

Ovaj flajer je informativnog karaktera, pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu

**Sunoko\***



# Zaštita od korova u šećernoj repi

## SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA

Korovi nanose najviše štete u toku prvih 8 nedelja nakon nicanja šećerne repe. Zavisno od vrsta i brojnosti u tom periodu, korovi mogu dovesti do smanjenja prinosa i do 80%.

Zbog toga parcele u tom periodu moraju biti čiste od korova.

**Najvažnije je prskati  
dok su korovi u fazi  
kotiledona !**



**Ciljno post em. tretiranje**  
Termini prskanja:

1. Termin: 1. post em. tretiranje (kotiledoni)
  - kada niknu prvi korovi
  - nezavisno od veličine repe
2. Termin: 2. post em.
  - cca. 10 dana kasnije
  - nezavisno od faze razvoja repe
  - voditi računa samo o spektru korova
3. Termin: 3. post em.
  - cca. 10-14 dana kasnije

Kombinacija herbicida utvrđuje se na osnovu spektra korova koji je prisutan na određenoj parceli.

Primer 1: Preporuka za tretiranje			
Abutilon, Tatula, Dvornici, Štir, Lubeničarka			
Tretman	Preparati	Faza razvoja korova:	
		kotiledoni	kotiledoni - 4 lista
1.	Belvedere 320 SC	0,8 l	1,0 l
	GAT Zebra OD	0,06 l	0,06 l
	Goltix Gold	1,0 l	1,0 l
2. i 3.	Belvedere Forte 400 SC	1 l	1,2 l
	GAT Zebra OD	0,06 l	0,06 l
	Goltix Gold	1,5 l	1,5 l

Primer 2: Preporuka za tretiranje			
Ambrozija, Tatula, Samonikli suncokret, Čičak, Palamida			
Tretman	Preparati	Faza razvoja korova:	
		kotiledoni	kotiledoni - 4 lista
1.	Belvedere 320 SC	0,8 l	1,0 l
	Hemoklop 100 SL	0,6 l	0,6 - 0,7 l
	Goltix Gold	1,0 l	1,0 l
2. i 3.	Belvedere Forte 400 SC	1 l	1,2 l
	Hemoklop 100 SL	0,5 l	0,6 - 0,7 l
	Goltix Gold	1,5 l	1,5 l

Zbog smanjenja rizika od oštećenja šećerne repe, savetujemo da se preparati sa etofumesatom (npr. Belvedere forte, Betanal MaxxPro i sl.) NE koriste u prvom prskanju.

Ukoliko nije korišćen u prva dva posta, preporučuje se dodatak Goltix Golda u dozi 2-3l/ha u poslednjem postu radi suzbijanja letnjeg spektra korova. Maksimalna količina podeljena u 3 post tretmana je 3-4 l/ha.

Umesto navedenih preparata mogu da se koriste i drugi provereni preparati sa istom aktivnom materijom.

## SUZBIJANJE TRAVNIH KOROVA

Primer graminicida	Semenski do 5 cm	Rizomski	Uz dodatak 3 dl okvašivača
Fusilade forte	0,8	1,3	1,0

## TEHNIKA PRSKANJA

- ne prskati po vrućini (preko 25°C)
- ne prskati između 9 i 20 h kada je toplo i sunčano
- u sušnim uslovima prskanje rano ujutro je 10% efikasnije nego uveče

## TOLERANTNOST REPE U ZAVISNOSTI OD VREMENSKIH USLOVA PRE I POSLE NJIHOVE PRIMENE

Očekivano vreme nakon prskanja				
Vreme pre prskanja	15-18°C velika verovatnoća za kišu	do 25°C oblačno preko dana	do 25°C veoma sunčano ili >25°C ali pre oblačno	>30°C
Poslednja kiša mnogo više od 2 dana, sunčano vreme				
Poslednja kiša pre 2 dana, oblačno, slab vjetar				
Poslednja kiša pre 2 dana, jako oblačno, bez vjetra, event. 1-2 puta slaba katkotrajna kiša				
Poslednja kiša pre 1 dana pre, sunčano vreme, razlika dnevnog noćne temp. >15°C				

■ Bez rizika po biljku    ■ Ne koristiti ulja, maksimalno mešati dva herbicida  
■ Ne koristiti ulja    ■ Ako je moguće prskanje odložiti za kasnije  
■ Ne prskati

Ako dan pre prskanja padne >5mm kiša, doze se mogu smanjiti za 15 – 20%, potrošnja vode 180- 250 l/ha.

**Ako korovi prerastu osetljivu fazu NE TREBA POVEĆAVATI DOZU PREPARATA, već podeliti jednokratnu dozu na dva dela i prskati dva puta u razmaku od 3 - 4 dana i menjati smer prskanja od jednog do sledećeg prskanja.**

Dodavanje 0,10–0,15% okvašivača poboljšava prijanjanje preparata za biljku i poboljšava efekat za 10–15%!!!

### Priprema rastvora u prskalici

- Preparati se počinju dodavati u prskalicu kada je rezervoar do  $\frac{1}{2}$  napunjen vodom.
- Mešač mora biti uključen neprestano !!!
- Najpre se dodaju preparati na bazi desmedifama i fenmedifana, a nakon nekoliko minuta mešanja i ostali herbicidi.
- Rezervoar prskalice dopuniti preostalom količinom vode.
- Okvašivač se dodaje na kraju.

Nedovoljno izmešan rastvor i nečista prskalica dovode do oštećenja i uništavanja useva repe



**MOLIMO VAS DA PRAVILNO PRIMENJUJETE PREPARATE, POŠTUJETE ZAKONSKE ODREDBE I KORISTITE REGISTROVANE PESTICIDE ZA ŽAŠTITU ŠEĆERNE REPE**